

Année
1773.

<sup>no 128.
d'après le</sup>
Remarque. Sur quelques Moyens
Curatifs dans les hernies intestinales accompagnées
d'étranglement, avec des observations qui en confirment
l'utilité: Par M. Nolleson le fils, cy devant
chirurgien aide Major des Camps et armées du
Roy &c. M^{re} en l'art et Science de la Chirurgie à
Paris le 15 Janvier.

La Réduction des Parties dans les hernies
intestinales avec étranglement, a de tout temps beaucoup
embarrassé les Praticiens. Les difficultés insurmontables
qu'elle a paru opposer à l'opération du taxis. de tous
les Auteurs qui ont écrit sur cette Matière,
aucun n'a paru décidé sur ses Réceptes. Les uns
ont proposé l'administration des Médicaments,
tant extérieurement appliqués, que pris intérieurement
avec des Saignées plus ou moins copieuses pour
parvenir à réduire les Parties Sorties. Les autres
ont conseillé les topiques et la Situation sans trop
faire connaître tous les avantages de ce dernier
Moyen, auquel ils avoient cependant confiance,
Mais dont ils n'ont pas assez déterminé les
usages pour en faire sentir l'utilité dans la
Pratique ultérieure. Ceux-cy ont eu Recours
au taxis qui leur a quelque fois réussi; et ceux-là
enfin ont regardé cette opération comme un



ARC 15 d. 17

Produit dans lequel la pression de la tumeur pouvoit
être la Cause des accidens gangreneux qui surviennent
aux hernies: en conséquence ils ont recommandé
d'avec préférence l'incision de la tumeur nommée
Hélotomie ou Célotomie, espérant par ce moyen
Réduire les parties avec plus de facilité.

Cette diversité d'opinions de la part des auteurs
qui ont traité cette Matière sans avoir aucune
Certitude physique du succès des Moyens qu'ils
ont employés, ne pourroit être attribuée qu'à un
défaut de Connoissance des Causes variées qui
Produisent les hernies et qui exigent des traitemens
différens, si l'Académie Royale de Chirurgie,
qui a discuté ce point de Doctrine dans ses
Savantes Collections, n'avoit par jetté le plus
grand jour sur la pratique de ces Maladies. Cette
illustre Société a donné en effet sur cette Matière
les Regles les plus précises, qu'elle a étayées d'
Observations intéressantes qui en confirment
de plus en plus la Solidité. Mais comme le
Nombre de faits ne peut qu'éclairer l'art et l'étendre
son Progrès, j'en propose dans ce Mémoire,
que j'ai l'honneur de Présenter à l'Académie
de Rapporter des observations, qui sans doute
ne sont pas sans exemples, mais qui n'ont
point encore été publiées pour l'utilité publique.

Ces Observations qui Militent en faveur Dutaxis
et qui démontrent la Nécessité qu'il y a de soulever
à la Situation des Malades suspendus les Pieds
en l'air et la tête en bas, pour parvenir à la réduction
de la plus part des hernies, pourront être liées à
des Principes et formes ou sont essentiel de Pratique
dans la chirurgie: (a) elles contribueront d'ailleurs
à détruire la Doctrine erronée de ceux qui ont
pensé reconnaître dans l'opération Dutaxis les
accidents gangreneux qui surviennent aux hernies
avec étranglement. J'appuierai mes Raisons et mes
observations d'autorités des Anciens et des Modernes,
qui paroissent avoir traité avec le plus d'érudition
et de connoissances Pratiques, ces sortes de
Maladies. D'après toutes ces Recherches, je
m'estimerois très heureux, si elles pouvoient
ouvrir une nouvelle Carrière aux Progrès de
l'art et mériter le Suffrage de l'Académie.

Les hernies intestinales avec gangrène
des Parties qui les forment, ne doivent pas être
regardées comme des faits bien rares, surtout

(a) Le Moyen de la Situation des Malades suspendus les Pieds
en l'air &c. pour tenter la réduction des hernies inguinales à déjà
été prévu par l'Académie de chirurgie dans le Mémoire de M.
Goursaud inséré dans le 4.^e vol. de ses Collections Page 243
et suivantes. mais il paroît que la quantité d'observations
nécessaires pour en confirmer l'utilité et le faire recevoir plus
particulièrement à manquer à l'Académie dont le Désir a
toujours été d'étayer ses Préceptes sur l'expérience.



quand on a négligé d'Employer les moyens convenables
pour Sarsenir à leur Reduction, soit par le taxis
et la situation du Malade, aidée des Remèdes
internes et des topiques, soit par l'opération, lorsqu'il
se présente des empêchemens légitimes qui
s'opposent à la Reduction des Parties d'une autre
Manière et qui exigent cette extrême Ressource.
Les Mémoires de l'Académie de Chirurgie nous offrent
beaucoup d'observations d'hernies avec étranglement
qui ont été suivies de gangrène des parties et dont
les Malades qui en ont fait le Sujet ont été guéris
par les seuls effets de la Nature. On voit encore nombre
de faits semblables consignés dans les auteurs et dans
les feuilles Périodiques, sans ceux qui sans avoir été
imprimés sont à la Connoissance de la plupart des
Chirurgiens du Royaume. Mais ces exemples
heureux, non plus que le succès des opérations,
quand la Nécessité de les faire en a paru déterminée,
ne font point un Recette de l'art applicable à tous
les Cas; d'où je conclus qu'on doit préférer pour la
Cure des hernies avec étranglement, les moyens
que l'Expérience nous a fait Connoître, à fin
d'éviter ces fâcheux accidens dont la Nature
Retriomphe par toujours, comme nous en
Donnerons la Preuve plus bas.
Quelques Chirurgiens Modernes ont prétendu

qu'on ne doit toucher les hernies avec
étranglement que bien doucement pour éviter les
accidents gangreneux dont elles sont susceptibles,
comme si ces accidents dépendoient essentiellement
du toucher de la Tumeur herniaire, même quand
elle n'est accompagnée d'aucun symptôme
inflammatoire. Cette façon de s'exprimer,
sans aucune restriction, en concluant du particulier
au général, sembleroit imposer l'exclusion
exclusivement et s'éloigner de la situation, tandis-
qu'il y a des Cas qui Nécessitent pour d'autres
Procéder pour obtenir la rentrée des Parties
Sorties. En effet tant de hernies, et entre autres
celles qui sont formées par engorgement de
Matières dans le tube intestinal, ou par
l'accumulation de quelques autres Matières fluides,
ne sont-elles pas susceptibles de Réduction
par l'attrectation ou le Maniement de la
Tumeur? ne sera-ce pas en comprimant ces
mêmes Matières dans un ordre Méthodique,
Le malade étant dans une situation convenable,
qu'on obtiendra leur Repulsion et la rentrée
de l'intestin? et ne seroit-ce pas encore s'
s'éloigner des Principes de l'art et exposer



la vie du Malade au plus grand danger que de
Rejeter absolument Ces Procédés Curatifs,
dont le succès a été confirmé dans tant
d'occasions. Cette doctrine qui a été proposée
par la plus-part des Anciens et que l'expérience
nous a fait adopter, ne peut-être Révoquée
en doute: elle mérite la préférence à beaucoup
d'égards, puisqu'elle est fondée sur les indications
de la Nature. C'est d'ailleurs le sentiment de quelques
Auteurs Modernes très Respectables, qui ont
cherché par de Solides préceptes à confirmer
Les Chirurgiens dans cette opinion, et à leur faire
Connoître que les accidens gangreneux qui
surviennent aux hernies avec étranglement,
ont d'autres Causes que le taxis bien dirigé,
auquel on devroit s'attacher plus particulièrement
ainsi qu'à la situation des malades suspendus
les pieds en l'air, Comme à ces moyens plus
sûrs que la bien faisance de l'air nous offre
pour la Réduction des Parties dans le plus
grand nombre des hernies inguinales, et que
depuis que d'anciens auteurs les ont proposées,
ils semblent avoir été Négligée par les
Chirurgiens Modernes pour Neuvrir de
préférence à l'opération Rarement indiquée.

et dont le succès ne répond pas toujours aux
vues du chirurgien ni à l'objet de l'opération. Or
il seroit donc à désirer pour le bien et le soulagement
des Malades affectés de hernies que tous ceux
qui sont dans le Cas de traiter ces sortes de
Maladies, Jugeassent avec discernement de leurs
différentes Causes qui peuvent en faire varier
le traitement pour en obtenir la Cure, ainsi
que le dit M. Goursaud dans son Mémoire (a)
Car c'est toujours l'Examen réfléchi des
faits qui conduit à une heureuse pratique.
Les observations que je décrirai plus bas
Confirmeront cette assertion et Renouvelleront
en faveur de l' taxis et de la Situation Renversée
du Malade, la Doctrine de ceux qui ont Conseillé
d'employer ces moyens pour la Réduction des
hernies.



Ambroise Paré, (b) qui a connu les hernies
sous la Dénomination de harques ou de Grevures,
décrit la Méthode qu'on doit suivre pour
faire rentrer la Partie. " Le chirurgien donc
" étant appelé pour réduire l'intestin tombé en
" labourse, situera l'enfant au lit où sur une
" table, la tête en bas, les fesses en haut et de ses
" deux mains pües apües fera la Réduction &c. "

(a) Collections de l'Académie Royale de Chirurgie Tom. 4. in 4.º pag. 276.

(b) Livre VIII. Chapit. XV.

La Situation du Malade peut donc beaucoup
favoriser la réduction des Dartres dans le
Lacis comme l'a observé Pare, et comme on
peut en inférer par les observations dont
voicy le Détail.

1^{re} observat. L'Esieu Jean Charles Salleron Laboureur
demeurant à Deuilly village distant de Vitry d'environ
deux lieues, me fit appeler au mois de May 1764.
Pour une hernie inguinale qu'il avoit au côté droit.
Les Dartres étoient forties avec étranglements depuis
48 heures. les chirurgiens des villages voisins du
Lieu de sa demeure, avoient fait faire usage
au Malade de Botrius, de l'arum et d'émollients
en Cataplasmes. les symptômes de l'étranglement
étoient considérablement augmentés depuis 24
heures quand j'arrivai. Je examinai la tumeur que
je trouvais assez grosse et qui étoit presque descendue
dans le scrotum: elle étoit dure résistante et sans
douleur. en conséquence au lieu de faire l'opération
qu'on avoit déjà annoncée au Malade comme
la seule Ressource qui n'étoit pour lui sauver la
vie, je Proposai au contraire d'essayer la
Réduction des Dartres par le Lacis et la situation:
pour cet effet je fis mettre le Malade sur
le bord de son lit, la tête en bas et les jambes

culair, un peu fléchies et soutenues par deux
aides, dont les bras s'assoient sous son jarret
droit. Douze minutes après qu'environ que le Malade
eut gardé cette situation, Je m'ariai l'atomeu selon
les bois du taxis; et par cette manœuvre j'obtins
la rentrée des parties entières peu de temps, sans
que le Malade se trouva incommodé dans la
suite.

2^eme Obser. La seconde Observation qui a pour objet l'accident
du Homme Corret anciennement Recteur d'Ecole et
habitant du même village de Droüilly, srouve d'une
manière convaincante l'avantage de cette situation
pour la Reduction des parties. Ce vieux Magister,
qui étoit affecté d'hermie, ne prenoit par d'autres
précautions toutes les fois que les parties étoient
sorties avec des accidents d' étranglement, que de
se faire suspendre la tête en bas et les pieds
culair; et entières peu de temps qu'il gardoit cette
situation renversée, les parties rentroient
naturellement. le plus grand nombre des habitants
du lieu a une connoissance de ce fait, qui a été
répété nombre de fois: Cependant le Malade en
est mort dans un âge fort avancé, pour avoir
négligé d'appeller un chirurgien qui auroit



toute la Réduction de l'hernie dans le taxis.
Cette situation qui lui fut si favorable dans les
autres Circonstances ne put opérer seule la Réduction
des parties dans son dernier accident; D'où l'on peut
Conclure que le taxis et les Remèdes doivent être
employés souvent avec la situation, quand ce dernier
moyen ne suffit pas. Pierre Bigrain en du
Soutiement de ceux qui ont adopté ces Règles;
il a toujours mis en pratique ces différents moyens,
Séparément ou conjointement, suivant que l'occurrence
paroissoit L'exiger.

Ces Procédés curatoires, dont le succès paroît
dû à la situation des Malades suspendus la tête
en bas et les pieds en l'air, me rappellent un petit
traité Chirurgico-historique que j'ai lu, et qui a été
imprimé à Lyon en 1584. Sous le Nom de
M^{re} François D'arriot Médecin. On y
apprend que dans l'Inde orientale, dans les états
du Roy d'ava et de Dégû, anciens pays de
Brachmanes, les habitants de ces contrées Sujets
aux hernies inguinales appellent très Rarement des
Personnes pour en faire la Réduction. La
Situation qu'ils prennent la tête en bas et les
pieds en haut, suffit presque seule pour faire

Autres les parties: voicy les Expressions de l'auteur.
" C'est chose admirable, devoir ces hommes exercés de
" harquer le guerrier sans que pour icelles Medecins
" les visitent: Nature operant seule en leur étrange
" posture, l'atèle en bas et les Diedo contre mont;
" Jarrets ~~mutuans~~ portants et Retenant le corps pendu.
" Rarement il adviens qu'en cette posture, Malade
" aide nature de leurs mains pour faire la Reduction
" de la Hernie &c. &c. Je crois qu'on peut ajouter foy
aux Remarques de M^{re} François D'artot, car on
ne voit par lix quel auroit pû être son Motif pour
en imposer et encore moins les Raisons qui auroient
pû le Determiner à faire ces Remarques dans un
ouvrage où le but de l'auteur n'étoit point de traiter
des hernies spécialement, mais en les supposant
sincerement faites, elles ne peuvent que beaucoup
éclairer la Pratique ultérieure pour la cure de ces
Maladies.

Fabrice D'Aquapendente (a) qui conseille
aussi la Reduction de l'hermie en la comprimant
en différents sens et en administrant des topiques
Relatifs, propose cette Situation. " que si tous
les susdits Remèdes sont inutiles, il faut prendre
" le Malade par les pieds et le Secouer souvent —
" étant auparavant couché sur le Dos, l'atèle)

(a) Première Partie du Livre Premier Chap. XXXII.

en bas et les dits pieds en haut &c.

M. Louis étant élève à l'hôpital Royal Militaire de Metz communiqua à l'Académie de chirurgie deux observations sur les hernies inguinales rentrées naturellement, les Malades ayant été suspendus la tête en bas et les ~~membres~~ pieds en l'air. Ces deux faits qui doivent intéresser les chirurgiens dans la Pratique de ces Maladies sont rapportés dans le 4^{ème} volume des Mémoires de chirurgie (a).

3.^{ème} observ. L'année chose vint d'arriver au Jeune Monin Graugez. menuisier demeurant en cette ville Rue St. Marc, Lequel étoit Couffé depuis trois jours aux soins de M. M. Guillemain et Dufrenoy Chirurgiens vices Confreres: ils appliquoient sur la tumeur herniaire qui étoit d'un volume assez gros, après avoir inutilement tenté le taxis, les Remèdes émolles et les huiles, dont on fait usage assez fréquemment, quand M. Rousselet Marchand en cette ville et voisin du Malade, vint leur proposer de suspendre le Patient les pieds en l'air et la tête en bas: moyen qui avoit toujours réussi à M. son Pere dans tous les Cas de Stranglement de l'hernie dont il étoit affligé. Sur ce Recit le Jeune Graugez a été suspendu de la manière susdite, les jarrets portés sur les épaules, de deux aides; et au moyen du taxis employé

(a) Pages 274 et 275.

dans cette situation, la Réduction des Parties
a été faite sur le champ. Le Malade a continué
l'exercice de sa profession dès le lendemain qui
étoit le 20. Juillet dernier.

On doit bien sentir par les exemples la solidité
des Principes de nos Doctes qui recommandent
l'usage et la situation des Malades avec tant de
confiance, pour obtenir la Réduction des Parties
dans les hernies inguinales avec étranglement. —

Verduc (a) qui a écrit en 1684, propose encore
ces Moyens comme étant très efficaces pour y
parvenir. " On fait coucher, dit-il, le Malade
" sur le Dos, les cuisses écartées et les fesses un
" peu hautes. mais pour mettre plus commodément
" la tête en bas et les Pieds en haut (continue Verduc)
" il faut avoir un petit lit de Repos au Pied —
" duquel il y aura deux cordes passées sur deux
" boules attachées au plancher. en tirant ces
" cordes vous lever le lit autant que vous le
" trouverez à propos: par ce moyen vous renverse
" votre Malade avec grande facilité. " Cet
auteur donne ensuite les moyens qu'il faut
employer pour faire la Réduction et indique
les topiques suivant les Cas et les circonstances
qui en exigent l'application. il étoit d'ailleurs



(a) Pathologie de chirurgie Tom. II. Pag. 920. et 921. =

Si l'on a de la Possibilité de la Réduction des
parties en observant toutes ces conditions, qu'il dit
plus loin. " Dans les hernies il ne faut jamais faire
" l'opération que dans une extrême nécessité parce
" qu'il arrive Rarement qu'on ne puisse pas
" Mettre les Parties. "

Les Chirurgiens Modernes Souviens donc
bien de ne pas avoir négligé non seulement
la Situation du Malade tant recommandée
par Beaumont d'ancien, mais encore les
tentatives répétées du taxis pour la Réduction
des hernies. On a vu quelque fois les Parties rentrer
après un certain temps que ces moyens furent
employés et au moment où on ne s'y attendoit
pas. La Situation seule comme on le voit,
peut en assurer tout le succès possible.

Barbette (a) en donnant sa Méthode qu'on
doit employer pour faire le taxis propose
des topiques appropriés à la Maladie pour aider
à la Repulsion des Matières et de l'Intestin, si le
Manuel ne peut suffire sans ces secours; et
quoique cet auteur en dise peu sur la
Situation qu'il conviendrait de faire donner
aux Malades dans tous les Cas d'hernie

(a) œuvres de chirurgie et anatomique Pag. 43.

avec Etranglement, il s'explique assez pour
 en faire Comprendre l'utilité. " il faut coucher
 " le Patient Sur le Dos ayant les Dors Relâchés
 " en haut et un peu Élargis; il arrive assez
 " souvent que par ce moyen, les Boyaux où
 " l'omentum Retournent d'eux mêmes en leur
 " Place &c. M. Arnould qui a donné un
 " traité Complet Sur les hernies en 1749. en
 " conseille aussi la Réduction d'une Manière à
 " faire connoître que le taxis doit être employé
 " même à plusieurs Reprises dans une Situation
 " Convenable. Boërhaave (a) et Garangeot (b)
 " sont tous deux d'accord Sur ce Procédé dans
 " toutes les circonstances où les accidents primitifs
 " ne sont pas inflammatoires. les deux observations
 " suivantes viennent étayer ces Principes et
 " prouvent la Nécessité de les mettre en usage.

1^{re}
 1. observ.

M. Becassan marchand Tapissier en
 Cetteville âgé de 75 ans me fit appeler la nuit
 du 18 au 19 Janvier de l'année dernière 1771. à
 l'occasion d'une hernie inguinale qui sortoit du
 Côté droit. Je trouvai l'abdomen herniaire
 de la grosseur d'un œuf d'oie qui s'étoit un peu

(a) aphorismes de chirurgie Commentés Par Wan-sswieten
 Tome 4. S. 278. Page. 92.

(b) traité des opérations 2^{me} édition.

allongée vers Jerofolim. Les accidens d'Etranglement
se manifestèrent presque aussitôt que d'issue d'ex parties.
Mon premier soin fut d'abord de M'occuper de
la Réduction de l'herne, quelques saignées
préliminairement faites. Je fis donner ensuite
au malade Des lavemens émolliens et j'appliquai
sur l'abdomen un Cataplasme Relâchant qui
fut précédé d'une Embrocation sur la partie,
avec des jaunes d'œufs, de l'huile Rosat et
supérieur d'aunevier : tous ces Remèdes furent
inutiles. Ce défaut de succès tant dans le
taxis que dans l'application des topiques,
me fit prescrire au malade pour boisson l'Eau
de Rivière dans laquelle j'avois fait mettre
une once et demie de Sel De pson par
suite. Je fis encore, mais en vain, des tentatives
pour réduire l'intestin. Je fis mettre ensuite
le malade tête en bas et les pieds en haut,
J'essayai, dans cette posture, le taxis à
différentes reprises, mais toujours
inutilement. Les aides qui faisoient des
progrès rapides, ne m'empêchèrent point
de faire de quatre heures en quatre heures

les mêmes essais, en faisant observer au malade
dans l'opération l'usage de la même situation,
et qu'il conservoit tant qu'il pouvoit dans les
intervalles de repos tentatives. Je parvins en fin
par ces procédés, au bout de 48 heures à
réduire la partie, sans avoir fait beaucoup
de compression sur la tumeur. Le malade que
j'ai usagé aujourd'hui d'un Bandage,
se sent très bien porté depuis ces accidents.

^{1^{re}} observ. J'ai traité depuis le malade, le fils de M. Janson
M. Boulaugne demeurant en cette ville, d'une
hernie inguinale Complète du côté droit. J'ai
observé le même traitement que celui dont je
viens de donner le détail, que j'ai modifié
suivant l'âge de cet enfant qui avoit alors
cinq ans et suivant les circonstances qui ont
accompagné la maladie. Dans cette même
situation et par le taxis que j'ai réitéré, j'ai
obtenu le troisième jour la rentrée de la partie.
L'application d'un Bandage a contenu l'hernie
et a même opéré la guérison radicale de
ce malade en six mois et demi.

Ces faits confirment des préceptes établis



Dans le 4^{em} Volume de Mémoires de
L'Académie Royale de Chirurgie. M.
Goursau dans ses Savantes Remarques
sur la différence des Causes de l'Étranglement
dans les Hernies, décrit la Méthode qu'il
croyoit employer pour parvenir à leur
Réduction, quand il y a des indications
qui en assurent la Possibilité. il est
bien éloigné de penser dans ce cas-là,
que l'opération dirigée par des Mains
habiles, conduite par l'intelligence, soit
susceptible des inconvénients que l'on reproche
lui reproche certains auteurs indistinctement.
On lit de plus dans ce Savant Mémoire,
que M. Lapeyrolle jeune membre de
L'Académie de Chirurgie de Paris en
s'étant vu à la Réduction d'une hernie
inguinale après 72 heures d'attente
réitérée, sur le même Particulier, Siquenois
chez M. le Duc de Ville Roy, auquel ce
moyen avoit déjà réussi huit mois avant
par les Soins du même Chirurgien. M.
Loup qui fut Consulté dans ce cas

~~Circumstances, bien éloigné d'être d'un fâcheux
contraire conseille la réduction et proposa
les moyens convenables pour faire rentrer
les Barriers.~~

La situation des Malades suspendue
les pieds en l'air et la tête en bas, pour aider
à la rentrée des Barriers sortier, me rappelle
un fait d'une espèce assez intéressante pour
entrer dans le nombre des observations
que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie
et confirmer de plus en plus l'avantage de
cette situation.

^{Comme}
C. observ.

Le nommé Glaser allemand natif de
Colmar où des environs travaillait au mois
de gbre 1761 dans une Boutique de Menuiserie
à Francfort sur le Mein, portoit une hernie
du côté droit qui sortoit assez fréquemment,
parce que ce garçon n'avoit jamais pu
s'habituer à l'usage d'un Brayer: et pendant
celui donnoit aucune inquiétude. Lorsque
les parties étoient sorties et qu'il y avoit des
symptômes d'étranglement, qu'il connoissoit
d'abord par les nausées, le vomissement,
quelques douleurs dans le ventre et souvent



Le hoquet qui le mouroit. De bonne heure
chez luy, il le mettoit au lit les fesses vuides
élevées après avoir pris un lavement, ensuite
il prenoit, quand il étoit à jeun, un purgatif
composé d'un gros de semence et d'une demy-
once de sel d'epsom qu'il faisoit infuser
dans un verre d'eau, où qui différois trois
heures pour le prendre quand il avoit
mangé. Deux heures après ce remède, il
se faisoit suspendre par un bonnet fort,
la tête en bas et les jambes en l'air, les
jarrets portants sur ses épaules; il n'estoit
dans cette attitude un quart d'heure plus
ou moins, jusqu'à ce que l'hérnie fut
revenue. il arrivoit quelque fois, que le
malade étoit obligé dans cette posture
de presser légèrement la tumeur pour aider
l'intestin à rentrer. il ne devoit ensuite
deux ou trois selles qui terminoient sa
guérison. M. M. Letoit et Degoutte
chirurgien de l'armée et moy avons vu
et été témoin de ce Procédé, qui, si on
l'a vu rapporté à cet homme, luy

avoit aussi plus de trente fois depuis trois
ans qu'il étoit alors affligé d'hermie. il nous
a assuré de plus qu'à falsebourg, où il avoit
travaillé, il avoit vu faire la même Manœuvre
à bien des gens, qui en pareil accident, ne
prenoient pas d'autres précautions pour la
Cure de cette Maladie; mais que le purgatif
auquel il avoit grande confiance, lui avoit
été conseillé par M. Keitzler ancien
chirurgien Major d'un Régiment Suisse,
lequel avoit eu occasion de le voir deux fois
dans son incommode.

Ce fait ne confirme-t-il pas encore plus
l'avantage de la Situation du Malade, —
Savoir en bas et les pieds en l'air, pour la
Cure des hernies, et en même temps la Réalité
des Principes de M. Monro, qui prétend
qu'un purgatif vapéur agaceant dans le
Coeur d'hermie où les Matières s'accumulent
dans les intestins, doit être employé
Extrêmement, parceque dit-il, les
intestins alors trop affaiblis par le poids
des Matières, ne peuvent les expulser du
Côté de l'anus, ce qui peut occasionner



Le gonflement de la Section d'intestin comprise
dans l'hernie et empêché sa réduction
par le taxis.

Franco, dans son traité des hernies
Chapitre XV. Consulte aussi les purgatifs
avant d'essayer la réduction de la partie
par le taxis auquel il ne paroît avoir de
confiance qu'en donnant la situation
aux Malades pour faciliter le succès de
cette opération. L'efficacité des purgatifs
administrés en pareil cas, a été publiée
par quelques auteurs qui en avoient
reconnu le bon effet. M. Samarié
le D^{re} chirurgien à Avignon Est le
premier à qui le hasard ait fait découvrir
l'usage du Sel de psom dont le succès
a été confirmé par l'expérience dans
beaucoup d'occasions. On peut lire les
observations de M. le Grand chirurgien
à Arles, qui ont été publiées à ce
sujet (a). J'ai presque toujours employé
le Sel de psom avec la même réussite
dans tous les Cas d'hernie où la fustion

(a) Mémoires de Chirurgie 4^{ème} Vol. in 4^o Pag. 265 et 266.

de l'intestin n'étoit pas assez forte pour occasionner
des accidents inflammatoires primitifs.
L'observation suivante en est une preuve bien
constante: elle fait sentir en outre la nécessité
qu'il y a d'employer ces remèdes à propos dans
le traitement des hernies et spécialement dans
celles qui sont formées par engorgement de
matières.

7.^{ème} Observ. M. Niel Bourgeois de cette ville âgé de
6 ans qui porte depuis plusieurs années
une hernie du côté droit, qu'il contient par un
bandage; négligea plusieurs fois l'application
de son bandage dans le cours de l'année 1770.
Les parties sortirent toutes les fois que cette
négligence fut marquée et tombèrent dans
le scrotum: le volume en étoit considérable,
et les symptômes de l'étranglement étoient
pressants. Le malade vomissoit à chaque
instant des matières bilieuses et stercorales;
et le hoquet étoit permanent. Dans
différentes circonstances, je fis donner au
malade avec de l'érection
émollientes. Je le mis à l'usage d'une boisson
d'eau avec le sel de soude et je lui fis observer
la situation susdite, les jambes en l'air et la

téléembarras. par ces Moyens Nécessaires plusieurs
fois dans l'année, aumeine Malade, tantôt
j'ai vu d'autres les parties Seules, dont les effets
a été suivi de bonne felle; et tantôt après
les avoir aidés par le laccio et l'application
de catopiques Relatifs.

Le volume de la tumeur herminaire formée depuis
plus de 48 heures lorsque je fus mandé la dernière
fois que l'accident arriva au malade qui fait le sujet
de cette observation, ne fut par un Motif qui m'arrêta
sur l'usage de ces moyens Curatifs; et quoique le
Malade parut alors éprouver les Symptômes
les plus graves; la fièvre étoit peu de chose, et il
n'y avoit aucune Sensibilité à la tumeur. D'ailleurs
la grande constipation qui avoit précédé l'accident,
me fit préjuger que l'intestin étoit rempli de matières.
C'est pourquoi je tentai hardiment la Réduction de
l'hermie par le laccio, dans la Situation Susdite.

C'est sans doute en considérant l'Etat des parties
sous ce point de vue, que Gonzius recommande
de faire le laccio à plusieurs reprises différentes,
si la Réduction est possible et que la tumeur ait
un volume Considérable; Car vraisemblablement
cet auteur entendoit par ce volume, la quantité
de Matières accumulées dans l'intestin; ce que

Suppose peu ou point d'inflammation les premiers
Jours : et par conséquent, quand le Chirurgien étoit
appelé assez tôt pour pouvoir entreprendre la Réduction
sans danger. On ne doit pas donner d'autre
interprétation à ces paroles de l'auteur, si on veut
avoir égard à ce que dit Bellosse chirurgien
d'hôpital, (a) Sur le volume Des Tumeurs herniaires.
" Si l'Intestin, dit-il, est précipité tout d'un coup
" dans le Scrotum, dans un volume considérable
" C'est alors que le Mal est très sérieux et qu'il ny
" a point de temps à perdre. Et il y auroit un
Contraste étonnant entre les sentimens de ces deux
auteurs qui pourroient devenir dangereux dans
la Pratique en les prenant pour Modèles, si on
n'évitait pas dans leurs vues. Ce qu'il y a de
certain, c'est que le taxis et la Situation renversée,
La tète en bas, commun et mis en usage tant par
les anciens que de nos jours, ont sauvés la vie
à quantité de Personnes affligées de Descentes,
même à celles dont les tumeurs herniaires
étoient considérables et qui peut-être seroient périées
ou par les suites fauchées de cette maladie, si on
n'eût pas tenté ces Moyens, ou par l'opération si
elle n'eût pas été bien indiquée. Les auteurs
les plus sages qui ont discerné judicieusement

(a) Tome II. Pag. 149.

il arrive cependant quelquefois que les hernies ne
sont pas, quoi qu'on en employe tout ce
Secours de l'art pendant plusieurs jours. alors on
doit supposer des Causes particulières qui s'y opposent,
qu'on ne peut détruire que par l'opération. il faut donc
la pratiquer dans ces cas là pour faire rentrer les
parties engagées dans l'anneau et éviter la
Mortification qui ne manqueroit pas d'y arriver
et de faire périr le Malade, Si la Nature ne
triomphoit pas de ces accidents. Comme dans les
Cancers qui ont fait le Sujet des observations
qui ont été publiées jusqu'à présent sur la Cure
des hernies avec gangrène des Parties. D'ailleurs
les Symptômes de l'inflammation qui doivent
précéder la Mortification des parties, s'annoncent
pour l'ordinaire par des signes assez sensibles
pour déterminer le temps auquel le Chirurgien
doit opérer. M. Goursaud, dont nous
avons déjà parlé, a judicieusement déterminé
toutes ces circonstances dans le 1^{er} Cas de son
Mémoire sur la différence des Causes de
l'Étranglement dans les hernies.

Thermin (a) s'en décide pour l'opération,
mais en admettant, Préliminairement des axes,

(a) Œuvres de Thermin contenant le traité des opérations des
tumeurs &c. Recueillies par Guillaume Bartholin en 1638. ch. XL.

la Situation et les Mêmes. „ que s'il ne peut
„ être Réduit (l'intestin) par la situation —
„ convenable, les Clistères et Cataplasmes
„ Remollients, la douce fomentation d'eau froide
„ et par l'adresse de la Main, il en faut venir
„ à l'opération, qui est bien souvent de telle
„ nécessité, que si le boyau n'est Réduit dans
„ le 3^{me} ou 4^{me} jour, il tombe en gangrène
„ et la rend inutile. Mais quoique cet
autour donne trois ou quatre jours pour faire
l'opération, il ne faut pas toujours compter sur
ce Délai, il arrive quelquefois des accidents
plutôt, quand la Réduction des Parties n'est
pas faite. C'est donc comme nous l'avons
déjà dit, au jugement du Chirurgien à
distinguer les Symptômes qui doivent le
détourner à l'opération, plutôt ou plus tard.

Belleste chirurgien d'Hôpital, (a) dans sa
Méthode proposée pour Réduire l'Intestin —
tombe dans le scrotum avec étranglement, prétend
qu'en 24 heures les accidents les plus graves
peuvent survenir et occasionner la gangrène
des Parties, si la Réduction n'est pas faite.

C'est peut-être la même Crainte qui a fait
préférer à Saviard, l'opération aux autres

(a) Tom. II. Pag. 145. et suivantes.



moyens proposés pour la Réduction d'une hernie.
On conviendrait qu'il peut y avoir des Circonstances
particulières qui exigent cette Célérité: il y a
même des Exemples, quoique Rares, d'hernies
incarcérées terminées par la gangrène et la
Mort en moins de 24 heures. Heister, (a) —
assure que la gangrène des Parties peut arriver
dans ce délai, surtout dans les Sujets forts
et vigoureux. » Fere enim Post vigesimam quartam
horam Presertim in vegetis ac junioribus, ut jam
diximus, gangrena vel Spachelus intestina Prolapsa
inflammata et incarcerata invadit atque perdit. &c
Cet auteur étoit tellement persuadé de l'accident
qui pouvoient survenir ensuite de l'inflammation
qu'il recommande au Chapitre CXVII. Page 756.
de faire promptement l'opération, si les Parties ne
sont guéries par les taxis et les autres moyens que
l'Etat et la Situation des choses peuvent indiquer,
à fin d'éviter la gangrène de ces parties &c. » Si jam
tum incarcerata vel intercepta est hernia, sive id
ab annulo Musculi abdominis nimis elastico fiat, sive
ut Dranius etiam observavit, (b) a parte Superiore
ipsius Sacci, qui intestina prolapsa continet, atque
sic comparata, ut ob inflammationem concitata

(a) institution: Chirurgie. Tom II. Cap. CXIV. Pag. 740. S. X.

(b) obs. chirurg. Tom. I^{er} obs. 57. et 58.

persuam constrictionem non acutissimis tantum
doloribus atque Supra Memoritis malis ægri
exerceantur, sed intestina quoque refundi prorsus
nequeant imo ope inflammationis cum Sacco
concrescant, Ferrum continuo eadem fere Natione
adhiberi, proforamine isto, perquod intestina
proruperunt, dilatando a quibusdam solet;
quemadmodum scilicet in omphalocèle posuimus,
ne gangræna oriatur. M. Boissieu de Sauvages

Dans sa Nosologie Méthodique traduite du latin
par M. e Nicolas (a) vient encore à l'appui de
ces assertions. " quand l'intestin est étranglé,
" dit-il, par l'ouverture qui a donné issue aux parties
" ou par le Sac herniaire, les parties s'enflamment
" s'abcèdent et tombent bientôt en gangrène, si l'on
" ne fait promptement la Réduction, ou si l'on ne
" débride l'ouverture qui Cause l'Etranglement."
Mais quoique ces Reflexions paroissent judicieusement
faites, elles sont encore trop générales pour en faire
une juste application, et ne déterminent pas assez
les Cas dans lesquels il Convient d'employer, ou les
Remèdes et le taxis de ou l'opération. nous
renvoyons en conséquence aux Mémoires de
L'Académie Royale De Chirurgie, où tous ces
faits sont discutés avec le plus grand discernement.

(a) Classe 1^{re} ordre VI. Page. 242 et suivantes.

la Stratégie qu'on doit spécialement suivre, selon les
Circoustances de la Maladie, y est établie par des
principes incontestables. Ces Reflexions serviront
seulement avec les observations dont je vais donner
le Détail à prouver en faveur du taxis contre le
Sentiment de ceux qui Croient Reconnoître dans
Le manuel de cette opération la Cause de la
gangrène qui survient aux parties dans les
hernies avec étranglement.

^{8^{eme}} observ. Madame Chabon Femme séparée de son Mary
vivant demeurant en cette ville âgée de 70 ans
et d'un tempérament pituiteux, Eprouva Vers le
mois de 7^{bre} 1768. les accidens d'une hernie
inguinale dont les parties étoient sorties avec
étranglement. M. Guillemain Son Chirurgien ordin^{re}
se contenta dans cette Circonstance d'appliquer
des Emolliens sur la tumeur pendant quatre jours
et de faire prendre à la Malade pendant le dit tems
des huileux et des lavemens qui furent employés
sans succès: au contraire les symptômes devinrent
plus violents, ce qui le détermina à demander
une consultation. M. Broûal Chirurgien attaché
au Corps des Grenadiers à cheval du Roy et moy,
fumes Consultés. nous ne vîmes la Malade que
le 7^{eme} jour, et nous Jugémes après L'examen
que nous fîmes des parties, que L'opération qui étoit

la dernière Ressource qu'on auroit pu Employer —
dans cette occurrence ne pouvoit plus avoir lieu tant
à cause de l'extrême faiblesse de la Malade que
de l'Etat gangreneux et d'affaiblissement dans lesquels
les parties étoient tombées; ce qui ne laissoit
entrevoir aucun espoir de guérison; aussi la
Malade Mourut-elle 24 heures après qui étoit
le 8^{me} jour. à l'ouverture du Cadavre qui fut
faite à l'incü du Chirurgien ordinaire et de plusieurs
des Sarens à cause de leur Préjugé contre ce moyen
d'instruction, On remarqua que les tégumens et une
partie des Muscles du bas-ventre étoient sphacelés.
L'intestin qui contenoit quelques matières fécales dans
sa portion comprimée dans l'anneau étoit crevasse, sans
qu'il parut avoir souffert une grande constriction.
Vrai-semblablement toutes ces parties gangrenées —
auroient donné issue aux matières épanchées dans
le sac et aux excréments si la Malade eut vécu —
quelques jours de plus, ou si les progrès de la gangrène
se fussent faits avec plus de célérité et eussent
occasionné l'ulcération de la peau.

Cette observation offre bien de Cas qui justifient
que l'attraction ou le Maniement de la tumeur —
herniaire, n'est point une Cause absolue de la
gangrène subséquente de ces parties, puisque M.
Guillemin n'employa alors pour tenter la réduction
des parties aucune force Manuelle, C'est-à-Dire



Letaxin. Nous sommes donc autorisés à croire que
 Consiste essentiellement dans la Négligence des moyens
 Curatifs. Comme l'observe M. Louis. En effet, si
 au commencement de cet accident la réduction de
 l'hernie eût été tentée par les voyes Méthodiques et
 qu'on eût employé tous les moyens dont nous avons
 déjà parlé, je ne douterois nullement d'après l'Etat
 des Parties, toutes que nous les avons trouvées, que la
 Malade Neût triomphé des accidents fâcheux qui l'ont
 conduit au tombeau. voici un Second Exemple d'accidents
 gangreneux dans une hernie inguinale Complètement également
 terminée par la Mort du Malade, qui s'en Refusa aux
 Moyens de Soulagement dont il avoit fait usage quelques-
 uns avant avec tout le succès possible.

9.^{eme} Observ. M. Aubert Le Bere Bourgeois de cette ville âgé
 d'environ 72 ans, d'un bon tempérament, portoit depuis
 long-temps une hernie d'icôté de l'autre qu'il contenoit par
 un Bandage, mais dont la Compression fut assez négligée
 pour permettre l'issue des parties, qui furent bientôt
 suivies d'accidents d'Étranglement. Je parvins à la
 Réduction de l'hernie au moyen du Sel Depson que
 Je prescrivis à la dose d'une once par pintes d'eau pour
 boisson; de la Situation du Malade, les pieds en l'air
 et l'utérin qui fut légèrement fait, quoique les Parties
 fussent d'un volume Considérable et tombées dans le
 Scrotum. M. Aubert se porta très bien après la
 Réduction faite, mais au bout de 15 jours de cet
 accident, et par l'omission du Bandage, les parties

Fortirent Denouveau. M. Aubert ne s'en étouma point,
il s'en rapporta à l'avis d'un grenadier à cheval qui
lui fit appliquer sur les parties, un Cataplasme de miel
de Bain et d'eau de Goulard qu'il avoit vu Neussir sur
un de ses Camarades. mais la fièvre, les vomissements
fréquents, les douleurs et la tension de l'abdomen, la
sensibilité de la tumeur le hoquet fréquents &c.,
furent les symptômes qu'il éprouva ensuite et qui
le déterminèrent à m'appeller vers la fin du 3^{eme}
Jour. après avoir examiné l'Etat du Malade et
Reconnu tous ces fâcheux symptômes, je lui fis
plusieurs saignées assez copieuses, je lui prescrivis
des lavemens Emollients et des Cataplasmes de laetibus.
Ces Remèdes furent administrés sans succès. la
violence des accidens me détermina à proposer au
Malade l'opération comme l'unique moyen qu'il
convenoit d'employer pour mettre sa vie en sûreté.
Il ne voulut jamais y consentir. les Docteurs du Malade
auxquels je fis part, eurent pour cette opération
la même Repugnance. M. Broial fut consulté
en présence de M. Blanchard Docteur en Médecine
de cette ville; ils furent tous deux de mon avis; mais
inutilement cherchèrent-ils à persuader le Malade!
On se contenta donc de faire usage d'anodins, de
fomentations douces émoullées, de lavemens de
Cataplasmes &c, jusqu'au 7^{eme} jour qu'un accide
gangreneux vint terminer le jour du Malade.
On doit bien sentir par ce fait la nécessité qu'il



ya d'employer la situation et le taxis dans le principe
de ces Maladies pour parvenir à leur Curation. Le
premier accident de M. Aubert qui a présenté les mêmes
symptômes qui se sont rencontrés dans celui-ci avant
l'état inflammatoire des Parties, prouve la suffisance
de ces moyens, lorsqu'ils sont employés encore assez
tôt pour éviter les accidents consécutifs qui surviennent
plutôt ou plutôt, suivant que l'intestin souffre une
contraction plus ou moins grande.

La situation des Malades suspendus la tête
en bas et les pieds en l'air, me paraît d'après l'expérience
un moyen bien certain pour la réduction des hernies.
Le succès qu'elle a eu dans beaucoup d'occurrences,
doit lui faire mériter la préférence sur tous les autres.
M. La faye dans ses Remarques sur les opérations
de Dionis (a) recommande la situation des Malades
dans les cas d'hernies avec étranglement des Parties.
Cet auteur a également observé qu'on pouvoit en tirer
de grands avantages dans la Pratique. On ne doit pas
non plus négliger cette situation de taxis, lorsque
l'abousson d'eau avec le sel Depson aura été
préliminairement administrée; Car l'un et l'autre
doivent concourir avec la situation, dans certains
cas, à opérer la guérison des Malades, auxquels
on pourra éviter, en suivant ces moyens, non seulement
la douleur de l'opération, mais encore ses suites
qui peuvent en être fâcheuses comme la dit Lommus
et comme le confirme l'observation suivante.

(a) Page 342 de la 1^{re} édition.

10^{eme}. observ. Dans le courant de l'année 1763. M. Janson
N. bourgeois demeurant en cette ville Nui d'ite J.
Germain, éprouva des accidens d'Étranglement dans
une hernie inguinale qu'il portoit du Côté Gauche
depuis plusieurs années. On ne fit aucune tentative
de Réduction. Le Malade étoit alors confié aux
Soins d'un Chirurgien Nôtre de trouppes et d'un
apothicaire. Ces MM. se contentèrent de faire
administrer au Malade des Dôctions huileuses, des
Lavemens et d'appliquer sur la tumeur des Cataplasmes
émolliens et Résolutifs; mais l'inefficacité de ces
Médicamens qui furent continués pendant deux
Jours, et l'augmentation des Symptômes, déterminèrent
L'Ex-chirurgien et l'apothicaire à demander M.
Maillet Chirurgien à halous sur marine pour
faire l'opération de l'hermie. M. Maillet
arriva le 3^{eme} jour au Soir: il Nôpera le Malade
que le lendemain au Matin vers les 11. heures. J'assistai
à cette opération. L'intestin qui étoit sorti de environ
deux travers de Doigts avec une portion d'Épiploon,
étoit sain dans tous les points de sa continuité
quoiqu'un peu Rouge: et quoi qu'il fut Réduit
après l'opération avec toute la Méthode possible,
le Malade Mourut le même jour à cinq heures, Malgré
tous les Soins qu'on donna à son état. On a
Cependant Remarqué aucune Cause apparente
d'une mort aussi prompte: elle ne peut être attribuée
dans ce cas-là, à aucun Étranglement de l'intestin



dans l'intérieur du ventre par quelques brides &c. : car
avant d'être réduit en sa place, on la reconnut
libre entour sous, même avant l'incision de
l'anneau que l'opérateur a cru nécessaire pour en faire
la réduction. Circonstance qui vient encore à
l'appui de nos réflexions en prouvant que la
situation et le taxis auroient pu s'effectuer avec
succès les premiers jours de l'accident. Je n'omettrai
par non plus de faire observer que deux heures après
la réduction faite des parties, le Malade fit
quelques selles à l'aide de lavement qu'il prit,
d'où l'on peut conclure que c'est encore moins
l'accumulation des matières dans le tube
intestinal qui a fait la cause de la Mort.

Beaucoup d'opérations de hernie avec
étranglement, font juger au chirurgien par
l'inspection des parties qu'il découvre, qu'on
peut et qu'on doit même tenter avant l'incision
des parties, la réduction de l'intestin par le
taxis et la situation. Les deux observations
suivantes que J'emploierai pour terminer
ce Mémoire, acheveront de prouver l'utilité
de ce moyen, Malheureusement trop
négligé dans la Pratique.

II^{ème} observ. Un Particulier nommé Le Maire portefaix
demeurant au faubourg de vitry En perthois de
cette ville, avoit une hernie inguinale du côté

gauche qu'il portoit depuis long-temps et qu'il
Contenoit par un Bandage. mais à la suite de
quelques travaux pénibles auxquels il fut livré,
l'intestin sortit malgré le Bandage, qui vrai-
semblablement ne se trouva pas assez serré. l'issue
des Dardiers qui se fit en 9^{bre} 1764. fut accompagnée
d'accidents d'Étranglement. Jeû M. Duret & M^{re}
en chirurgie de cette ville fut mandé pour voir
ce Dardier: il s'y transporta et fit administrer
au Malade tous les Secours de l'Art qui lui
parurent convenables en pareil Cas, mais sans
succès. deux jours et deux séculerem avec
augmentation des Symptômes. l'opération
parut alors indispensable à cause de
l'intensité des accidents. M. Duret en homme
éclairé la proposa au Malade et me conduisit chez
lui pour la lui faire en sa présence et avec
M. haudon son aide très intelligent. après
l'ouverture du Sac nous trouvâmes l'intestin
qui formoit une anse de la longueur de deux
travers de doigts, rouge en cette partie et
boursoufflé. L'étranglement étoit si grand que
je ne pus introduire ny ma Sonde ny le bistouri
herniaire entre l'intestin et l'anneau pour faire
l'incision et réduire la partie. Je proposai à
M. Duret et à M. haudon, la Situation du
Malade suspendu la tête en bas et les pieds



culaw. Le Nomme Lalloz, homme fort et vigoureux s'chargea de suspendre le Malade: il le prit sur son Dos, en sorte que ses jarrets porteroient sur ses Epaulles. Cette posture favorisa la Rentree de l'Intestin en moins de cinq minutes. M. Duret et M. Baucos furent fort etonnez de voir ce Procédé Curatif, qu'il ne connoissoient pas. Le Malade fut ensuite pansé selon les Regles de l'Art et guerit parfaitement en moins de trois semaines. La dernière observation qui suit offre des conséquences à tirer qui ne sont par moins essentielles dans la Pratique de cette Maladie.

12^{eme} observ. Le mois de 7^{bre} 1769. Je me suis trouvé dans l'obligation de faire l'opération d'une hernie inguinale le 3^{eme} jour des accidens d' étranglement à la cuisinière de M. Garçon Moncoufere qui fait sa Residence à Helzmaurupt distant de 4 lieues de Strasbourg. L'intestin étoit dans le meilleur état possible pour obéir au taxis si on l'eût tenté méthodiquement, ou qu'on eût fait mettre le Malade dans la situation susdite, qui auroit peut-être suffi pour la réduction des Barrières. Rien ne paroissoit pouvoir s'opposer au succès de ce moyen tant recommandable, s'il eussent été employés le 1^{er} ou le 2^{eme} jour.

avant que des accideus inflammatoires indiquassent
l'opération. M. Deguyenne Medecin, M. M. Garçon
et Blouin chirurgiens, qui ont assisté à cette
opération, ont remarqué comme moi l'Etat dans
lequel étoient les Borties. Je réduisi facilement
l'intestin sans inciser l'anneau, quoi qu'il contiât
quelques Matières fluides et qu'il parut boursoufflé.
La Malade en fin en guérie en très peu de temps
à l'âge de 66 ans.

Cette observation concourt avec les autres
à démontrer évidemment les Raisons qui doivent
faire préférer le taxis et la situation du Malade
à tête en bas et les Dieux en l'air, pour parvenir
à la Cure des hernies inguinales avec étranglement.

La facilité avec laquelle j'ai fait rentrer
l'intestin de cette malade sans inciser l'anneau,
jointe à d'autres faits qui nous apprennent
qu'en pareil Cas la réduction des Borties
a été faite sans nous plus avoir touché à
l'anneau après l'ouverture du Sac herniaire,
mettent cette preuve dans son plus grand jour ^(a)

(a) M. Bouquet Chirurgien des Gardes du Corps à Troyes et en
Chef de l'Hôtel Dieu de la ville a été présent à une opération de la
hernie inguinale avec étranglement, faite à une femme au
Hôtel Dieu par M... chirurgien de la Survivance, dans la
quelle après l'ouverture du Sac l'intestin fut réduit avec
facilité sans faire d'incision à l'anneau. M. Broûal chirurgien
de l'Hôtel Dieu de Troyes, pour lors à Troyes, m'a assuré avoir été
le témoin de ce fait.



Depuis l'accumulation des Matières fluides dans
la portion du tube intestinal embrassé par la tumeur,
qui avec la rareté qu'il contenoit l'avoient —
boursoufflé, n'indiquoit-elle pas encore —
d'administrer à la Malade le premier jour la
boisson d'eau avec le sel de pson, ou un purgatif
équivalent pour aider à la réduction des parties,
Conjointement avec le taxis et la situation. —
L'expérience nous a suffisamment fait —
connoître l'avantage de ce Remède pour ne point
être négligé dans de Cas semblables. —
Les symptômes inflammatoires qui ont déterminés
l'opération n'étant survenus que le troisième
jour, ont donné assez de délai pour qu'on put
tenté avec succès ces moyens si salutaires,
dont on ne sauroit trop recommander
l'usage dans la Pratique.

C'est encore dans le détail de ce fait qu'on
sent tout le faux de la Doctrine de ceux qui
ont cru que les accidens gangreneux qui
surviennent aux hernies avec étranglement, —
dépendoient du Maniement de la tumeur, quoi
que Méthodiquement fait. En effet si de tels
accidens fussent survenus à la Femme même
comme à la Malade qui fait le sujet de

la 8^{me} observation que j'ai rapportée cy devant,
soit parce qu'on auroit éludé l'opération que
l'intensité des accidens requerroit, soit parce
qu'on auroit continué l'usage infructueux des
Remèdes, seroit-on en droit pour cela d'en
inférer que le taxis y auroit contribué, quand
même on l'auroit essayé dans le principe
de l'accident, avant que les Symptômes
inflammatoires eussent paru; non certainement
ce raisonnement seroit inconséquent et
deviendrait illusoire!

On peut faire icy l'application des Préceptes
Lumineux qu'a donné M. Louis dans sa
Mémoire sur la Cure des hernies intestinales
avec gangrene. (a) Ce Célèbre Chirurgien
observe judicieusement, que la Cause qui produit
ce dernier et fâcheux Etat, est
toujours la Négligence des Moyens Curatifs
Sagement Employés, (b) et non pas le taxis,
qui quand l'action en est bien dirigée,
ne peut qu'accélérer la Reentrée des parties
Sorties, dont l'Effet d'ailleurs ne pourroit être

(a) Mémoires de l'Académie Royale de Chirurgie Tom. 3. Pag.
145 et suivantes.

(b) Tulpius rapporte qu'un homme fut atteint d'une
hernie à une ancienne plaie du bas-ventre, il la négligea
La gangrène s'y mit et fut Cause de sa mort. obs. Méd. Lib.
3. ch. XX Pag. 24.

préjudiciable que dans les Cas inflammatoires
comme nous l'avons déjà observé et dans les
hernies fortement étranglées et incarcerated, où
la réduction des parties est rarement possible
sans le secours de l'opération: Circonstance
que le jugement et les Connoissances du
Chirurgien doivent faire distinguer d'avec les
autres Causes qui produisent des hernies
sans inflammation primitive, et qui par consé-
-quent peuvent exiger autant de différents
Moyens Curatifs dans leur traitement.

On sait que toutes les hernies sont
susceptibles d'inflammation et de gangrène
à la suite de l'étranglement des parties, quand
la réduction ne s'en fait pas? l'expérience
ne le confirme que trop. mais N'en-on pas
eu droit de conclure d'après toutes nos
observations, que pour éviter ces accidents
fâcheux, dont la Nature ne triomphe pas
toujours, même par l'opération, quand elle
paroît acquiesce, il conviendrait dans toutes
les hernies inguinales avec étranglement de
tentier la réduction des parties par le taxis
et la situation des Malades suspendus
la tête en bas et les pieds en l'air, si le cas

l'exige, où que des accidents inflammatoires
qui viennent quelque fois tardivement puissent
le permettre; de ne point se laisser de ces
tentatives; de les mériter au contraire suivant
les circonstances; d'employer conjointement
les Remèdes Extérieurs et Intérieurement
le Sel Depson Dissous dans l'eau pour
boisson; de varier et de modifier ces différents
Moyens suivant les indications; et de
rien venir en fin aux Ressources que nous
offre la Chirurgie Opératoire, qu'à l'extrémité,
c'est-à-dire lorsque les Symptômes
qui paroissent d'abord, ou qui sont consécutifs,
s'annoncent par la fièvre avec une douleur
vive, tension et sensibilité dans toute
l'étendue de la tumeur: Savoir vomissemens
fréquents de Matières bilieuses et
stercorales: Savoir la tension de l'abdomen
et par le hoquet, quand il survient aussitôt,
ou plus de temps après les autres symptômes.
C'est vraiment là le Cas de pratiquer l'opération
de l'Hernie comme l'unique moyen qui
reste et que l'art prescrit promptement
pour secourir les Malades et pour
éviter la Mortification des parties. Mais



Dans toutes les autres Circonstances où
ces Symptômes ne se rencontreront point pour
la plus grande Partie, on sera presque
assuré de l'avantage de Reduire les hernies
avec Stranglement, en suivant la Méthode
Curative qui offre la Situation Reversee
du Malade, et le taxis? Dans ces sages
Procédés dis-je, quantité de Malades
affligés d'hernies ne seront plus des
victimes sacrifiées à la crainte mal
fondée que paroissent avoir la plupart des
chirurgiens, de maltraiter les Parties
dans le taxis, et au peu de confiance
qu'ils ont dans les autres moyens. La situation
des Malades suspendus la tête en bas et les
pieds en l'air, en est un bien efficace que
l'expérience a fait découvrir pour la
Cure des hernies avec Stranglement: nous
croyons l'avoir assez bien prouvé dans
ce Mémoire pour faire sentir tous les
avantages qui doivent en résulter: il
seroit donc à désirer qu'il fût plus connu
et qu'on en fit un usage plus fréquent
dans la Pratique! Un bon Succès

alors plus étendue, pourroient rendre
mes réflexions plus dignes de contribuer
aux travaux de l'Académie sur cette
Partie de l'Art de guerir; et procurer
en même-temps à l'humanité les
Secours quelle semble Reclamer des
chirurgiens dans ces tristes occurrences?

Wolleson fils



Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and mostly illegible due to fading and the age of the paper. It appears to be a list or a series of entries, possibly related to a collection or inventory.

